

Arterial hipertenziyanın erkən diaqnostikasında sortilin və apo-B dəyərlərinin prediktor əhəmiyyəti

Aktuallıq. Arterial hipertenziya ürək-damar sistemi xəstəliklərinin inkişafı üçün əsas risk faktoru olaraq öz aktuallığını müasir dövrümüzdə də qoruyub saxlayır. Çox vaxt arterial hipertenziya zamanı iltihab prosesləri ilə yanaşı qeyri-spesifik iltihab markerlərinin də (hs-CRP, IL-6, TNF- α , sortilin və s.) rolunu da vurğulayırlar. Xüsusilə də son dövrlərdə sortilin və onun sələflərinin ateroskleroz, ürək-damar və karotid arter xəstəliklərinin inkişafında rolu ön plana çəkilir. Həmçinin lipid profil göstəricilə-rindən sayılan apo-A və apo-B müasir diaqnostik dəyərlən-dirmələrdə daha çox diqqət mərkəzinə alınır.

İşin məqsədi. Tədqiqat işimizin məqsədi yüksək qan təzyiqi müşahidə olunan pasientlərdə hipertenziyanın erkən diaqnostikası, mövcud risk faktorlarının öncədən qiymətləndirilməsi və proiltihabi marker olan sortilin arterial hipertenziyanın inkişafında prediktor rolunu göstərmək olmuşdur.

Material və metodlar. Mövcud elmi tədqiqat işi üçün 25-45 yaş arasında olan Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrində və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq qurumlarında xidmət edən hərbiçilər cəlb olunub. Tədqiqatımız zamanı 2019-cu ilin yanvarından 2021-ci ilin sentyabrına qədər 120 xəstənin ümumi sayı çalışdığımız prospektivli tədqiqata daxil olmaq üçün qiymətləndirilib. Xəstələr hipertenziya diaqnozu ilə (55 xəstə) və nəzarət (65 sağlam) olmaqla, hamısı kişi olmaqla 2 qrupa bölünmüşdür. Biokimyəvi parametrlərinin ölçülməsi IMMAGE 800 analizatoru (Beckman Coulter, CA, ABŞ) vasitəsilə Almaniya istehsalı olan ELİSA (Sigma-Aldrich, USA) reaktivindən istifadə olunaraq aparılıb. Müvafiq statistik test və korrelyasiya analizləri aparılmışdır.

Nəticələr. Bu nəticələr onu göstərdi ki, 25-45 yaş arası olan hərbiçilərdə arterial hipertenziyanın yayılma dərəcəsi ortalama 7,8 % təşkil edir. Serum sortilin səviyyələri 1,75 ng/ml-dən yuxarı 76% həssaslıq və 66% spesifiklik ilə arterial hipertenziya prediktə etmiş oldu. Həmçinin hipertenzialı hərbi qulluqçularda proiltihabi marker olan serum sortilin apo-B və LDL ilə pozitiv ($P \sim 0.001$) korrelyasiya təsbit olundu.

Yekun. Mövcud tədqiqat işimizdə arterial hipertenzialı xəstələrdə gələcəkdə ola biləcək yüksək qan təzyiqi xəstəliklərini öncədən müəyyənləşdirmək məqsədi ilə proiltihabi marker olan sortilin və apo-B dəyərlərinin prediktor əhəmiyyətinin önəmi öz tədiqini tapmışdır.

**Tibb xidməti mayoru İlahə
Ağayeva (Abdurəhmanova)**

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Tibb
Mərkəzi