

Kombinə olunmuş kimyaterapiya aparılan onkoloji xəstələrdə kaplan-meier analizinin nəticələri

Xülasə: Son illərdə xərçəng əleyhinə aparılan kimyəvi dərman müalicələrinin yenilənmiş protokollarla tətbiqi xərçəng xəstələrinin sağqalmasını artırsada, yanaşı olaraq əlavə təsirlərinə bağlı olaraq xəstəlik və ölüm faizlərini də artmaqdadır. Xərçəng əleyhinə müalicə üsullarının ciddi kardiotoxikliyi müalicə üsullarının ya birbaşa təsiri, ya da ürək-damar xəstəliklərinin risk faktorlarına sahib olan xəstələrdə patoloji prosesləri sürətləndirməsi ilə bağlı ola biləcəyi ehtimal edilir. Süd vəzisi xərçəngində daha çox istifadə olunan bir dərman olan docetaxel, digər antrasiklinlər, siklofosfamid və ya trastuzumabla kombinasiya halında, ya da sonra verildikdə ürək çatışmazlığı ehtimalını artırır.

Bu məqalədə, süd vəzisi xərçənginin müalicəsində geniş istifadə olunan antrasiklin tərkibli kombinasiya olunmuş sxemlərlə kimyaterapiya aparılmış xəstələrdə sağqalma göstəriciləri araşdırılmışdır.

Məqsəd: süd vəzisi xərçəngi olan xəstələrdə aparılan antrasiklin tərkibli sxemlər ilə kombinasiya olunmuş kimyaterapiyadan sonra sağqalma göstəricilərinin qiymətləndirilməsidir.

Material və metodlar: Tədqiqata süd vəzi xərçəngi olan antrasiklin tərkibli sxemlər ilə kombinasiya olunmuş kimyaterapiya aparılan kardioloji nöqtəyi nəzərdən praktik sağlam olan, 20-65 yaşlı (hamısı qadın cinsi, ortalama yaş $51,5 \pm 0,9$ yaş olmaqla) 50 və 70 xəstə daxil edilmişdir. Tədqiqat zamanı bütün xəstələrdə prospektiv olaraq kimyaterapiya kurslarına başlanılmazdan əvvəl və kurslar bitdikdən 1 il sonra aparılmış transtorakal exokardioqrafiya müayinə üsulu və kardiak biomarker (NTproBNP) nəticələri və ürək çatışmazlığının xarakteristikası dəyərləndirilmişdir.

Nəticələr: 12 aylıq müşahidə müddətində xəstələrdə dekompensasiya hallarının yaranma tezliyinin aşkar edilmə müddəti nəzarət qrupunda orta hesabla $(1,260 \pm 0,314)$, əsas qrupda isə $11,943 \pm 0,057$ olmuşdur. Tədqiqat qrupları arasında statistik əhəmiyyətli fərq izlənməmişdir ($p=0,014$). Kimyəvi dərman müalicəsinin yaşam göstəriciləri üzərindəki kardiotoxik təsirlərinin 12 aylıq müşahidə müddətində analizi zamanı tədqiqat qrupları arasında statistik əhəmiyyətli fərq izlənməmişdir ($p=0,237$).

Yekun: Kurslararası dövrdə lazımi diaqnostik və müalicəvi tədbirlərin görülməsi bu qrup xəstələrdə sağqalma göstəricilərinə müsbət təsir göstərir.

Bayramzadə S.R.¹

Mehdiyeva N.İ.²

Baxşiyev M.M.¹

Macidov M.Q.³

Daxili Xəstəliklər III kafedrası¹

Onkologiya kafedrası²

Cərrahi Xəstəliklər I kafedrası³

Azərbaycan Tibb Universiteti
Bakı, Azərbaycan