

Perkutan koronar müdaxilə olmuş xəstələrin covid-19 pandemiyası zamanı klinik nəticələrinin təhlili

İşin məqsədi: Bu çalışma COVID-19 pandemiyasının daha əvvəl perkutan koronar müdaxilə (PKM) olunmuş xəstələrə necə təsir etdiyini araşdırmaq məqsədi daşıyır. Çalışmada ölüm, hospitalizasiya, təkrar revaskulyarizasiya kimi klinik nəticələr və yoluxmanın bu nəticələrə təsiri araşdırılmışdır.

Material və metodlar: Çalışmaya COVID-19 infeksiyasına yoluxan 448 və yoluxmayan 810 xəstənin nəticələri daxil edilmişdir. 1258 PKM xəstəsinin demoqrafik məlumatları, yanaşı xəstəlikləri və klinik nəticələri retrospektiv təhlil edilmişdir.

Nəticələr: İlkin demoqrafik xüsusiyyətlərin təhlilində COVID-19 müsbət və mənfi kohortlar arasında siqaret çəkmə vərdişində (33,7% -ə qarşı 43,7%, $p = 0,001$) və diabetin yayılmasında (40,2% -ə qarşı 32,3%, $p = 0,005$) əhəmiyyətli fərqlər aşkar edildi. Klinik nəticələr kontrol koronar angiografiyası (KAQ), təkrar revaskulyarizasiya və bütün səbəblərdən ölüm hallarında əhəmiyyətli fərq göstərməmişdir. Bununla belə, COVID-19 pozitiv xəstə qrupunda hospitalizasiyanın əhəmiyyətli dərəcədə yüksək nisbətləri (18,8%-ə qarşı 0%, $p < 0,001$) və əksəriyyəti COVID-19 səbəbli olmaqla ölüm halları (75%, $p < 0,001$) müşahidə edildi.

Yekun: Bu tədqiqat COVID-19 pandemiyası zamanı PKM xəstələrinin klinik gedişi haqqında daha aydın təsəvvür yaradır. Hospitalizasiyanın və COVID-19 ilə bağlı ölümlərin yüksək nisbətləri bu xəstə populyasiyasına daha ciddi nəzarət olunmasını vurğulayır.

¹Oqtay Musayev,

²Rafael Daşdəmirov,

¹Firdovsi İbrahimov,

¹Kənan Əhmədov,

¹Məryəm Qafarova,

¹Sona Qasımzadə,

¹Nərgiz Müştəqzadə

¹Mərkəzi Klinik Xəstəxana,
Kardiologiya şöbəsi, Bakı

²Elmi Tədqiqat Kardiologiya
İnstitutu, Bakı